

PILI SHIELD® PORCINO + C NOVARTIS ANIMAL HEALTH

Bacterina-toxóide contra *Escherichia coli* e
Clostridium perfringens tipo C.

USO VETERINÁRIO

Composição

PILI SHIELD® PORCINO + C é uma bacterina-toxóide contendo todos os antígenos de 4 tipos selecionados de *Escherichia coli* os quais incluem K99, K88, 987P e F41 e *Clostridium perfringens* tipo C; os cultivos inativados são misturados para proporcionar uma proteção de amplo espectro com adjuvante hidróxido de alumínio.

Cada dose contém:

Clostridium perfringens - 621 CPU

Escherichia coli K99 - 1PR

Escherichia coli K88 - 1PR

Escherichia coli 987P - 1PR

Escherichia coli F41 - 1PR

Indicações

PILI SHIELD® PORCINO + C é indicada para uso em porcas prenhas saudáveis, como auxiliar no controle de doenças em leitões causadas por *Escherichia coli* e *Clostridium perfringens* Tipo C.

Dosagem, forma de aplicação e instruções de uso

AGITAR O FRASCO ANTES DE USAR.

Administrar duas doses de 2 mL cada, por via intramuscular profunda, atrás da orelha, em porcas prenhas, aproximadamente entre 5 e 2 semanas antes do parto, para obter a máxima transferência possível de anticorpos maternos. Revacinar os animais com uma dose de 2 mL, antes de cada parto subsequente, para manter altos os níveis de imunidade.

Advertências, precauções, contra-indicações e antídoto

Utilizar todo o conteúdo, uma vez aberto o frasco.

Reações anafiláticas podem ocorrer com o uso da vacina.

O tratamento é sintomático com epinefrina (adrenalina).

Agulhas e seringas devem ser esterilizadas ou descartáveis.

É indispensável que os leitões recém-nascidos recebam colostro materno no momento do nascimento, para assegurar a imunidade. Não vacinar animais enfermos, parasitados, subnutridos ou sob condições de estresse.

O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou antiinflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.

Período de carência

Não vacinar os animais durante os 21 dias antes do abate.

Condições de armazenamento

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C. **NÃO CONGELAR.**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO.

Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação

Frascos contendo 20 e 100 mL

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Novartis Animal Health US, Inc.
1447 140th Street - Larchwood, Iowa
51241-7566 EUA
U.S. Vet. License N° 303

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR: NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA.

Av. Prof. João Vilalobo Quero, 2.253
CEP: 06421-300 - Barueri - SP
CNPJ 00.820.120/0005-69

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob N° 9.391 em 11/06/2008

Responsável Técnico:

Denis Frota Daflon CRMV - SP n° 23.802

Informações ao cliente:

0800-888-8280

São Paulo - segunda à sexta
das 8:00 às 17:00 horas.

PRODUTO IMPORTADO

© 2008 Novartis;

Marca Registrada da Novartis AG, Basileia, Suíça.

168BRI-01
Cód.: 6.216.152-A